

Số: 05 /TB-TTĐVNN

Gia Lộc, ngày 01 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu vụ xuân

Thời gian qua, nền nhiệt độ và ẩm độ không khí thấp nên sau gieo cấy lúa xuân sinh trưởng, phát triển chậm. Qua kiểm tra đồng ruộng, diện tích lúa cấy sớm đã bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh, lúa gieo vãi từ sau gieo đến 3,5 lá chuẩn bị bước vào đẻ nhánh.

Cây rau màu vụ xuân chủ yếu Bắp cải, su hào, bầu, bí, mướp, rau ăn lá các loại, ngô.... tập trung tại các xã: Hoàng Diệu, Gia Lương, Lê Lợi, Phạm Trán, Đoàn Thượng, Toàn Thắng,...

Để lúa và rau màu vụ xuân sau gieo cấy và gieo trồng sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh hại, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp, khuyến nông viên cơ sở hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

I- Đối với cây lúa.

1. Điều tiết nước.

Đối với lúa cấy: sau cấy duy trì mực nước nông 2 - 3 cm.

Đối với lúa gieo thẳng, sau gieo bảo đảm đủ ẩm, khi mạ mũi chông đưa nước tràn mằm, sau đó, điều tiết nước theo mức độ sinh trưởng của lúa.

2. Bón thúc đẻ nhánh.

Khi lúa bén rễ hồi xanh và 50% số khóm ra lá mới thì tiến hành bón thúc nhằm giúp cho lúa đẻ nhánh sớm, đẻ tập trung, phương châm: “*Bón nặng đầu nhẹ cuối, thúc đẻ nhánh sớm, bón đủ và bón tập trung, không bón phân lại rai*”.

Lượng phân bón cho 1 sào là: 4 kg Urê + 2 - 3 kg Kali.

Để bón phân cân đối, hạn chế thất thoát phân sau khi bón và ảnh hưởng của thời tiết đến cây lúa, nên sử dụng phân NPK loại 13-13-13 + TE hoặc 16-16-8 + TE ... với lượng từ 13-15 kg/1 sào.

Lúa gieo thẳng sau khi tía dặm tiến hành bón thúc.

3. Tỉa, dặm.

- Lúa cấy: dặm kịp thời cho ruộng lúa bị chết do ốc brou vàng, chuột... hại nhằm đảm bảo mật độ.

- Lúa gieo thẳng: khi lúa có từ 3 - 3,5 lá tiến hành tỉa dặm đảm bảo mật độ 100 dảnh/1 m².

4. Trừ một nước.

Hiện nay, trên lúa gieo thẳng có một số ruộng bị một nước gây hại. Khi thấy có ngọn lúa bị héo thì sử dụng một trong các loại thuốc sau: Kỳ Đà 700 hoặc SAPHEN ALPHA 5EC,... để phun trừ kết hợp với dọn sạch cỏ dại trên bờ, nếu có điều kiện nên tháo cạn nước rồi phun thuốc. Sau phun 2 - 3 ngày thì đưa nước trở lại.

II- Đối với cây rau màu.

1. Cần tập trung chăm sóc và bảo vệ đúng với thời kỳ sinh trưởng của từng loại cây trồng.

2. Xử lý đất: Với diện tích trồng màu liên tục nhiều vụ để hạn chế nấm bệnh, tuyến trùng v.v... gây hại cho những vụ sau, biện pháp tốt nhất nên luân canh với cây trồng nước như: lúa, rau muống...

Dọn sạch cỏ dại và tàn dư của cây trồng trước, rắc vôi bột 20 - 25kg/sào, cày bừa, ngâm ngập nước thường xuyên từ 10- 15 ngày rồi rút cạn nước, để khô mới tiến hành lên luống trồng vụ tiếp theo. Sau khi lên luống cần tiếp tục xử lý đất bằng phun Sunphat đồng với lượng 0,5- 1 kg/sào. Khi trồng nên sử dụng nấm đối kháng Trichoderma bằng cách trộn với phân chuồng để bón lót và đất nấm.

Nếu trong điều kiện trời âm u, ẩm độ cao, đất không được ải nên làm thành luống vòng để trồng, sau đó trong quá trình vun xới sẽ làm thành luống.

3. Chăm sóc cây trong bầu.

Chăm sóc cây trong bầu, cây trong vườn ươm như: dưa lê, dưa hấu, dưa chuột, bầu, bí v.v... Trong điều kiện thời tiết rét có nắng, ban ngày mở nilon, chiều tối và đêm che lại, nhất là trong điều kiện đêm và sáng sương nhiều để hạn chế bệnh sương mai, lở cổ rễ. Khi cây cứng cáp mới đưa cây ra ruộng trồng, với bầu, bí, dưa: khi cây có 2 lá thật trở lên.

4. Trồng cây.

Lựa chọn các cây giống sinh trưởng khỏe, đồng đều nhau để trồng nhằm thuận lợi cho việc chăm sóc sau này. Trồng cây cao hơn mặt luống khoảng 1cm để hạn chế bệnh lở cổ rễ.

Đối với dưa lê, dưa hấu nên gieo trồng tập trung từ ngày 10/3- 20/3/2020 thời tiết thuận lợi cho cây dưa phát triển và khi thu hoạch không bị cạnh tranh với sản phẩm của các cây ăn quả như: vải thiều, vải lai...

5. Điều tiết nước.

Lựa chọn phương pháp tưới nước phù hợp từng loại cây trồng. Đối với đa số các loại cây như: dưa, ngô, bầu, bí, mướp... tưới rãnh là chính, đưa nước vào 2/3 rãnh sau 3 - 4 giờ tháo cạn. Hạn chế tưới mặt luống để mặt luống không bị

đóng váng.

6. Bón phân.

Bón lót đủ, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, bón cân đối đạm, lân, kali. Nên bón lót vào rạch giữa luống.

7. Tỉa, trồng dặm.

Đối với các cây bị chết cần trồng dặm và bón bổ sung kịp thời cho cây còi cọc tạo độ đồng đều trong ruộng.

Tỉa bỏ những lá già, lá bị bệnh không còn khả năng quang hợp tạo độ thông thoáng trong ruộng, hạn chế sâu, bệnh hại.

Lưu ý: - Liều lượng và nồng độ từng loại thuốc theo khuyến cáo trên bao bì.
- Phun thuốc hoặc rắc phân khi lá cây đã khô.

Nơi nhận:

- Chi cục TT&BVTV;
- TT Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Lê Kiên Quyết