

Số: 08 /TB-TTĐVNN

Gia Lộc, ngày 27 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa và rau màu vụ xuân

Hiện nay, cây lúa đang giai đoạn: đẻ nhánh- đứng cái, làm đòng; bệnh đạo ôn lá đã phát sinh và gây hại trên các giống lúa nhiễm: Nếp, BC15, Q5, TBR 225,...với tỷ lệ hại trung bình: 0,5- 1% cấp 1, nơi cao: 10% cấp 5 như một số chân ruộng ở cánh đồng Khu Ba Đồng, thôn An Thụ, xã Đồng Quang, ...; bệnh khô vằn gây hại rải rác. Trên cây rau màu xuất hiện bệnh héo xanh, bệnh lở cổ rễ, sâu xanh, bọ trĩ,... hại cây họ bầu bí.

Thời gian tới, dự báo bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn sẽ gia tăng cả về diện tích và mức độ gây hại, đặc biệt là ruộng lúa gieo cấy các giống nhiễm, chân ruộng mạ, ruộng xanh tốt, bón thừa đạm.

Để đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện thông báo:

1. Đối với cây lúa:

Tổ chức thăm đồng thường xuyên và theo dõi sát diễn biến thời tiết để phòng trừ:

- Bệnh đạo ôn lá: phun phòng trừ ngay khi vết bệnh vừa chớm phát sinh (trên 5% số lá có vết đạo ôn) bằng một trong các loại thuốc: *Filia 525SE*; *Fuji-one 40WP*; *Trizole 20WP*; *Amistar Top 325SE*;..

Những chân ruộng mà bệnh đạo ôn đang phát sinh thì ngừng bón phân đạm và chất kích thích sinh trưởng, giữ nước trong ruộng từ 2- 3 cm.

Sau khi phun 5- 7 ngày thì kiểm tra lại nếu thấy phát sinh vết bệnh mới hoặc những chân ruộng đã bị bệnh nặng hoặc phun xong trước 2- 3 giờ mà gặp mưa thì bắt buộc phải phun lại lần 2, lần 3; khi bệnh ngừng phát triển thì chăm sóc bình thường.

- Bệnh khô vằn bằng một trong các loại thuốc: *Tiltsuper 300EC*; *Callihex 5SC*; *Validacin 3SL, 5SL*; *Anvill 5EC*;...

2. Đối với cây rau màu:

Cây rau màu nhất là cây dưa rất mẫn cảm với một số loại thuốc nếu phun quá liều sẽ bị xoắn lá. Để phòng trừ sâu bệnh hại cần áp dụng triệt để biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM: Tập trung chăm sóc ngay từ giai đoạn cây con để cây khỏe; làm đất kỹ, lên luống cao, thoát nước tốt đồng thời tưới, tiêu hợp lý để đảm bảo độ ẩm đất; thu dọn sạch tàn dư cây trồng để hạn chế nguồn bệnh. Khi phát hiện sâu bệnh hại, sử dụng các loại thuốc phun trừ theo nguyên tắc 4 đúng, cụ thể như sau:

- Bọ trĩ, bọ phấn trắng bằng một trong các loại thuốc: *Confidor 100SL*; *Admire 50E*, *Radiant 60SC*, *Topchets 650WG*,...

- Bệnh chết ẻo cây con, bệnh nứt thân xì mủ bằng một trong các loại thuốc: Score 250E; Sumi-Eight 12.5 WP; Alpine 80WP; Kasumin 2SL; Bactocide12WP; ...

- Bệnh thán thư, bệnh giả sương mai bằng một trong các loại thuốc: Map-Super 300EC; Amistar 250SC; Ridomin 68WG; Antracol 70WP,...

- Bệnh héo rũ, héo xanh bằng một trong các loại thuốc: Starner 20WP, Aliette 800WG, Kansui 21,2WP, ...

(Liều lượng, nồng độ và cách dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn ghi trên bao bì)

3. Tiếp tục diệt chuột bằng mọi biện pháp như: Thủ công, cơ giới, hoá học, sinh học để bảo vệ lúa và rau màu. Tuyệt đối không được sử dụng điện để đánh bắt chuột.

4. UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế địa phương để chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp, khuyến nông viên cơ sở hướng dẫn việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa và rau màu, đồng thời tăng thời lượng phát thanh để các hộ nông dân biết và thực hiện./.

Nơi nhận

- Chi cục BVTV tỉnh;
- Thường trực HU;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ngành liên quan;
- UBND xã, TT;
- Các đại lý thuốc BVTV;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

Lê Kiên Quyết